Exmo(a) Senhor(a)

Antonio Paulo Pinto

Praia da Vitória, 17/11/2026

RM do ombro esquerdo

TÉCNICA:
Protocolo sem administração de contraste
RELATÓRIO:
Artrose acrómio-clavicular acentuada.
O acrómio tem uma morfologia tipo II
Marcada redução do espaço sub-acromial.
Pequeno derrame na bolsa sub-acromial-subdeltoideia.
Articulação gleno-umeral com pequeno derrame e sinais de condropatia de grau 2.
Não observo fraturas ou lesões expansivas ósseas.
Tendão do bicípete bem posicionado na goteira, sem alteração da estrutura, sem derrame ou lesões.
Tendinose moderada a severa do subescapular, sem sinais de rotura.
Rotura total do tendão do supra-espinhoso, com retração para o nível da glenoide.
Rotura total do tendão do infra-espinhoso, com retração para o nível da glenoide.
Não há alterações no tendão do pequeno redondo.
Músculos da coifa sem sinais de edema.
Observa-se marcada atrofia do músculo infra-espinhoso com degenerescência adiposa de grau 2 e ligeira atrofia do músculo supra-espinhoso com degenerescência adiposa de grau 1.
Não observo alterações dos ligamentos gleno-umerais.
CONCLUSÃO:
Roturas totais dos tendões do supra-espinhoso e do infra-espinhoso, com retração para o nível da glenoide, associadas a atrofia e degenerescência adiposa muscular. Artrose acrómio-clavicular acentuada e marcada redução do espaço sub-acromial. Condropatia gleno-umeral de grau 2, com pequeno derrame articular.

Henrique Rodrigues

40101 Henrique Rodrigues
Médico Especialista em Radiologia (CP-40101)